

# Внимание! Опасные вредители!

Многие садоводы осведомлены о том, какие вредители могут нанести непоправимый урон урожаю.

Виноградный клещ – один из самых распространённых паразитов, результатом вредительства которого становятся серьёзные повреждения на листьях винограда.

Появление пухового налёта и выпуклых покраснений на виноградной листве – это прямое указание на деятельность известного вредителя растительных культур.

Методы борьбы: существуют эффективные препараты против виноградного клеща: фуфанон-нова, ВЭ 13 мл на 10 л воды; Алиот, КЭ – 10 мл на 10 л воды; Би – 58, КЭ

Грушевый клоп – насекомое коричневого окраса. Спинку вредителя покрывает затейливый узор. Этот вид опасен для грушевых и яблоневых деревьев, айвы, абрикосов, слив, вишни. Поражённое вредителем дерево перестаёт завязывать плоды и, если, не принять меры, может погибнуть.

Против клопа используют такие препараты как Табачная пыль, П-500г/5 л воды, Инта – Ц-М.таб-10 таб на 10 л воды, Карбоцин, таб- 10 таб. На 10 л воды.

Опрыскивание должно быть обильным, чтобы вещество попало на обе стороны листов. Обработка должна выполняться в утреннее время до 10 часов или ближе к заходу солнца. Погода должна быть безветренной. Днём лечение производить не нужно, поскольку при высоких температурах воздуха есть риск ожога молодой листвы.